

УДК 598.292.2 (571.53)

А.В. Винобер, Е.В. Винобер

Фонд поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного сектора
«Сибирский земельный конгресс», Иркутск, Россия**СЕВЕРНЫЙ СОРОКОПУТ *Lanius borealis*
В ИРКУТСКОМ РАЙОНЕ**

В общих чертах рассмотрены экология и география северного сорокопута по литературным источникам. Собственные результаты носят в основном фенологический характер. Представлен список встреч северного сорокопута в Иркутском районе по данным наблюдений авторов за 2014-2024 гг. (28 встреч). Также авторами сделана выборка встреч по Иркутскому району из статьи В.В. Попова «Северный сорокопут *Lanius borealis* в Иркутской области» (45 встреч) и выборка встреч по Иркутскому району по данным сайтов «Птицы Сибири» и «iNaturalist.org» (36 встреч). По данным авторов северный сорокопут – редкий вид, появляющийся на зимовке в начале октября и отлетающий из Иркутского района во второй половине апреля. Учитывая тенденции сокращения и снижения численности популяций серого сорокопута во всем мире и практически полную неизученность вида в Иркутской области северный сорокопут должен быть в Красной книге Иркутской области

Ключевые слова: северный сорокопут, *Lanius borealis*, зимовка, фенология, Иркутский район

1. Обзор литературных источников

Наши систематические наблюдения за динамикой орнитофауны в Иркутском районе (окрестности пос. Молодежный и окрестности д. Жердовка) продолжаются уже более 10 лет. В отношении северного сорокопута *Lanius borealis* (рис.1) они имеют в основном фенологический характер. Поэтому, предваряя представление своих результатов, мы решили в общих чертах рассмотреть экологию и географию этого уникального и самого смелого мелкого хищника отечественной орнитофауны.

Ранее, мы именовали данный вид как серый сорокопут *Lanius excubitor*, основываясь на систематике [27]. Но под давлением научных авторитетов, конвенционально, мы согласились именовать его северным сорокопутом *Lanius borealis*. Но считаем, что пока здесь однозначного решения быть не может, потому что морфология и генетика вида на территории нашего

региона и по всему ареалу обитания северного сорокопута исследована весьма слабо, и однозначно утверждать, что ареал не содержит подвидового, а может, и видового разнообразия на громадной территории сибирского ареала – было бы слишком поспешно. Понятно, что не нам решать такие сложные вопросы, но высказать свое субъективное мнение, мы считаем, бесполезно.



Рис. 1. Северный сорокопут *Lanius borealis*
Окрестности пос. Молодежный. 6.11.2017. Фото авторов

Как отмечает Е.Н. Панов в своей монографии «Сорокопуты (семейство Laniidae) мировой фауны. Экология, поведение, эволюция» серый сорокопут *Lanius excubitor* единственный из палеарктических сорокопутов, освоивший не только огромные пространства Европы от арктической тундры до горных областей, но и расселившийся в Новый Свет» [23].

Первая российская монография, посвященная сорокопутам, появилась в конце XIX века (1881 г.), и до сих пор поражает своей фундаментальностью и непреходящим значением: М.Н. Богданов «Сорокопуты русской фауны и их сородичи» [3].

Ниже мы представляем несколько фрагментов из вышеобозначенной книги, которые нам видятся важными для настоящего обзора.

«От других родов серые сорокопуть отличаются большим ростом и черно-белой окраской хвоста и крыльев. Половые различия в этом роде – ничтожны, а возрастные – очень незначительны...

Северный сорокопут (*Lanius borealis*). Сведения об этом сорокопуге так отрывочны и запутаны, что вид стоит до сих пор очень непрочен... По наблюдениям Б.И. Дыбовского этот сорокопут прилетает на берега Байкала на зиму и остается тут с половины октября до половины апреля.

7 октября 1863 году Радде добыл экземпляр около Иркутска... Находка сибирского сорокопуга в земле чукчей указывает, что на востоке область его отдалена от американского сорокопуга только морем. Судя по находкам, надо полагать, что эта птица идет на север по тайге очень далеко и без сомнения гнездится там... В гнездовое время и на гнездовье наблюдает его только Радде в Саянских горах. На Байкале и в Южно-Уссурийском крае, также в Китае и Туркестане эта птица попадалась наблюдателям только на пролете и на зимовке. Так что в общей сложности очертить границы области гнездовья этой птицы пока не возможно» [3].

Что касается систематики, Богданов придерживается весьма осторожной позиции: «Систематическое определение наблюдаемой формы вовсе не так легко, по той простой причине, что в науке точного, абсолютного критерия вида нет. Отсутствие этого критерия, в связи с недостаточностью материала и недостаточностью обширной литературы, порождают те ошибки, с которыми пришлось бороться в этой работе. Будучи убежден, что я сладил с этой трудностью, в то же время готов утверждать, что сам сомневаюсь, действительно ли мне удалось установить точно виды, породы и разновидности» [3].

В своих выводах Богданов указывает: «Одни виды кажутся установившимися, другие, наоборот, находятся в периоде крайней изменчивости (сравнение *L.minor* и *L.borealis*) [3].

Как отмечают современные зарубежные исследователи: «Изменение климата существенно влияет на биологическое разнообразие во всем мире. Так, например, 3 декабря 2019 года во время кольцевания птиц, проводимого на орнитологической станции в Литве, была поймана и окольцована особь сибирского сорокопута (*Lanius borealis sibiricus*). Для подтверждения вида был взят дополнительно образец крови. На основании анализа сообщается, что это первая регистрация сибирского сорокопута в Литве» [28].

На постсоветском пространстве серый сорокопут наиболее основательно исследован на территории Республики Беларусь [1, 13, 20, 21]. Как сообщают белорусские орнитологи М.Ю. Немчинов и В.В. Гричик, серый сорокопут *Lanius excubitor* является весьма интересным объектом для выяснения многих вопросов биологической науки, в первую очередь – экологии, адаптации, филогенетики и этологии, а также выступает природным фактором регулирования численности популяций ряда вредителей сельского хозяйства.

Авторы обследовали 36 гнезд и описали более 50 гнездовых участков (надо сказать, что на территории России подобного объема исследований по сорокопуту в XXI веке встретить в публикациях нам не удалось – А.В. и Е.В.) [20].

Авторы отмечают, что вид не встречается в глубине лесных массивов и на обширных полях без деревьев – ему необходимо открытое пространство с обилием присад. Авторами определена частота гнездования в шести местообитаниях. Наибольшее количество гнезд отмечено в популяции верховых болот в разреженном древостое. Именно сильно разреженный древостой позволяет птицам эффективно эксплуатировать кормовые ресурсы.

Также М.Ю. Немчинов и В.В. Гричик условно делят популяции на «луговых» и «верховых болот» и выделяют две защитные модели поведения (защиты гнезд от человека): 1) агрессивное, шумное поведение, ложное пикирование с резкими криками; 2) тихо, менее заметно покинуть гнездо.

При этом нередки случаи, когда они бросают гнезда даже после однократного приближения человека к дереву, что усложняет определение успеха размножения [20].

Ранее, В.В. Ивановский и В.Я. Кузьменко отмечали, что на Белорусском Поозерье серый сорокопут *Lanius excubitor* гнездится исключительно на верховых болотах, а зимой встречается, в основном, в агроландшафте. Гибнет от хищных птиц: тетеревятника, беркута, дербника [13].

Надо сказать, что в разных регионах России уровень изученности вида сильно разнится, и, видимо, с этим связано различие статуса вида в разных регионах. Например, в Псковской области, практически по соседству с Белорусским Поозерьем, серый сорокопут – редкий гнездящийся, пролетный и зимующий вид. Возможно, что в настоящее время в Псковской области он стал чаще появляться в сельскохозяйственных угодьях, не избегая соседства с жильем человека [10].

В сибирских регионах серый сорокопут *Lanius excubitor*, как и северный сорокопут *Lanius borealis*, также имеет разную степень изученности и разный статус пребывания. Как и весьма неясной является (на наш взгляд) граница между ареалами этих видов (как можно однозначно утверждать, что в нашем регионе северный сорокопут, а в соседнем регионе – только серый сорокопут? Если учитывать повсеместную слабую изученность и такие факты, что северный сорокопут может залетать в Литву? Весьма вероятно, что может иметь место наложение или взаимопроникновение ареалов серого и северного сорокопута).

Из довольно скудных сведений по сибирским регионам, складывается следующая картина (как нам увиделось в первом приближении).

В Республике Тува В.И. Забелин отмечает серого сорокопута в зимнее время как обычного врага для буроголовых гаечек и других воробьиных в дневное время [12].

В Томской области серый сорокопут *Lanius excubitor excubitor* гнездящийся вид. Но биология вида изучена недостаточно. Занесен в Красную книгу [22].

А.В. Ковалевский и соавт., рассматривая распространение сорокопутов в Кузнецко-Салаирской горной области, представляют свою версию соседства ареалов серого и северного сорокопутов: «На основе кластеризации внутри очерченных комплексов обоснована необходимость рассмотрения нескольких группировок, ранее объединявшихся в качестве *Lanius excubitor* в широком смысле как самостоятельные виды. В частности, представители «серых сорокопутов», обитающие в Сибири, должны быть отнесены к двум политипическим видам: собственно серый сорокопут *Lanius excubitor* в узком смысле, населяющий большую часть Европы и Зауралье, а также лесостепную зону Западной и Средней Сибири, и северный сорокопут *Lanius borealis*, включающий палеарктические подвиды и североамериканские подвиды. Поскольку такая трактовка систематического положения принята в современном списке птиц России и сопредельных государств, здесь они приводятся как два самостоятельных вида.

Серый сорокопут *Lanius excubitor* – ареал охватывает северную часть Европы, Зауралье и Западную Сибирь к западу и югу примерно от долины Оби, сопредельные районы Казахстана, а также юг Средней Сибири к востоку до Иркутской области. Широко распространенный сибирский подвид северного сорокопута *Lanius borealis sibiricus*, отличающийся более светлой общей окраской и более слабой исчерченностью нижней стороны тела, граница ареала, по видимому, севернее Томска и не южнее устья Ангары [14].

Для Восточного Саяна серый сорокопут *Lanius excubitor* указывается как зимующий вид. Предпочитаемые кормовые биотопы – опушки долинных лесов, распадки в горной лесостепи в нижних частях склонов, заросшие древесно-кустарниковой растительностью. На зимовке – облигатный орнитофаг [11].

В Республике Бурятия серый сорокопут *Lanius excubitor sibiricus* занесен в Красную книгу: статус IV категория, редкий, оседлый, местами кочующий, малоизученный вид [15].

О распространении и характере пребывания сорокопута в Бурятии существуют противоречивые мнения. По одним – это редкая оседлая, гнездящаяся птица Станового нагорья и северной части Витимского плоскогорья, редкая зимующая в Восточном Прибайкалье и Селенгинском среднегорье. По другим – определено не гнездящаяся на Витимском плоскогорье и Муйской котловине. Гнездование отмечено в зарослях кедрового стланика в подгольцовой зоне хребта ХамарДабан [15].

На станции кольцевания птиц «Байкальская» в период весенней миграции (01 апреля – 15 июня) с 2015 по 2018 серый сорокопут *Lanius excubitor* отмечен как кочующий вид [2].

По Иркутской области имеется одна обзорная статья по северному сорокопуту *Lanius borealis* В.В. Попова (2018 г.). В ней сообщается, что эта форма ранее включалась в состав *Lanius excubitor*. В Иркутской области, несмотря на широкую известность, хорошую узнаваемость и заметность, этот вид остается малоизученным.

До сих пор остается неясной область его гнездования и достоверно не обнаружено ни одного гнезда, а число встреч в летнее время крайне незначительно [24].

Также В.В. Попов приводит сведения из статьи Т.Н Гагиной (1961) [9], где вид указан гнездящимся для Южно-Байкальского, Ангарского, Тунгусского орнитогеографического участков, долины Иркут и Восточного Саяна. Но при этом не указаны конкретные факты гнездования.

В монографии Ю.В. Богородского серый сорокопут *Lanius excubitor* – редкий вид Южного Предбайкалья, встречающийся круглогодично [4].

На основании анализа летних встреч В.В. Попов делает предварительный вывод, что вполне вероятно, что данный вид в

незначительном количестве гнездится в северных районах области, и возможно, в горных лесах.

Так как большая часть встреч северного сорокопута приходится на населенные пункты, в основном, на город Иркутск, это может быть связано с тем, что в холодное время года ограничено количество полевых работ, и основная часть наблюдателей находится в населенных пунктах, особенно в г. Иркутск и его окрестностях. Также В.В. Попов отмечает, что осенью и весной практически не выделяется пиков пролетов, встречи распределены равномерно, и можно сделать вывод, что северный сорокопут в Иркутской области – редкий гнездящийся и малочисленный пролетный и зимующий вид, распространение и экология которого остаются малоизученными [24].

М.В. Сони́на и Н.В. Морошенко отмечают, что серый сорокопут *Lanius excubitor* регулярно зимует в Байкальске и встречается там с октября до конца апреля. В рационе его питания доминируют чечетки и большие синицы [26].

Также М.В. Сони́на сообщает, что в черте Иркутска серый сорокопут *Lanius excubitor* встречается только на зимовке, придерживаясь значительных по площади зеленых насаждений (парков, кладбищ, Ботанического сада ИГУ). Крайними датами его пребывания в городе являются 29.09.1977 и 14.04.1975. Рацион зимующих в Иркутске серых сорокопутов на 84% представлен большими синицами [25].

Ю.И. Мельников (2010) отмечает, что Предбайкалье входит в ареал серого сорокопута *Lanius excubitor*. Вид встречается как в летнее время, так и в зимнее. Однако, летние его встречи единичны, а факты достоверных находок гнезд или выводков отсутствуют, хотя вне сомнения, что он здесь гнездится [16].

В статье 2012 года Ю.И. Мельников оценивает серого сорокопута *Lanius excubitor* как «очень редкий, не ежегодно зимующий вид Верхнего Приангарья и Южного Байкала, встречающийся единичными особями» [17].

В статье 2015 года Ю.И. Мельников сообщает, что на правом берегу истока р. Ангары (Южный Байкал) в зимний период (2010–2014 гг.) общая плотность населения серого сорокопута *Lanius excubitor* составляла $0,6 \pm 1,3$ ос/км² и средняя плотность на селитебной территории – $0,1 \pm 1,2$ ос/км². Из выделенных типов основных местообитаний серый сорокопут встречается только на селитебной территории диффузного типа [18].

В статье 2016 года Ю.И. Мельников относит серого сорокопута *Lanius excubitor* к «очень редким, гнездящимся и зимующим видам, которые иногда отмечаются на территории Дендрологического парка (Южное Предбайкалье, исток р. Ангара) в зимнее время» [19].

Ранее, в статье 2010 года, Ю.И. Мельников сообщал, что «за 45 летний период работы в данном регионе этот вид встречен мной зимой (пройденны тысячи километров) не более 5 раз, в т.ч., дважды – у истока Ангары. Однако на территории Усть-Ордынского Бурятского округа в окрестностях деревень Батхай и Кударейка, он отмечается чаще, и наиболее обычен здесь в осеннее, зимнее и ранневесеннее время, что обусловлено постоянными исследованиями, проводимыми здесь специалистами-орнитологами. Однако, вполне вероятно, что большую роль в его зимовке на этом участке играют и более мягкие зимние условия лесостепного района» [16].

2. **Результаты** наших встреч представлены в таблице 1, отдельные фоторегистрации на рис. 1, 2, 3.



Рис. 2. Северный сорокопут
Lanius borealis
Окрестности д. Жердовка.
5.10.2024. Фото авторов

Таблица 1 – Встречи северного сорокопута в Иркутском районе по данным наблюдений авторов за 2014-2024 гг.

№	Дата встречи	Место встречи
1	11.10.2014	окр. п. Молодежный
2	22.03.2015	окр. п. Молодежный
3	18.10.2015	окр. п. Молодежный
4	15.10.2016	окр. п. Молодежный
5	17.10.2016	окр. п. Молодежный
6	18.10.2016	окр. п. Молодежный
7	02.03.2017	окр. п. Молодежный
8	11.03.2017	окр. п. Молодежный
9	23.04.2017	окр. п. Молодежный
10	03.10.2017	окр. п. Молодежный
11	06.11.2017	окр. п. Молодежный
12	02.10.2018	окр. п. Молодежный
13	18.10.2019	окр. п. Молодежный
14	23.10.2019	окр. п. Молодежный
15	05.10.2020	окр. д. Жердовка
16	18.10.2020	окр. д. Жердовка
17	25.02.2021	окр. д. Жердовка
18	14.03.2021	окр. д. Жердовка
19	06.10.2021	окр. д. Жердовка
20	14.11.2021	окр. д. Жердовка
21	29.11.2021	окр. д. Жердовка
22	19.12.2021	окр. д. Жердовка
23	07.02.2022	окр. д. Жердовка
24	05.11.2022	окр. д. Жердовка
25	07.03.2024	окр. д. Жердовка
26	05.10.2024	окр. д. Жердовка
27	08.10.2024	окр. д. Жердовка
28	29.12.2024	окр. д. Жердовка

Совпадение числа встреч за годы наблюдений в окрестностях пос. Молодежный и окрестностях д. Жердовка совершенно случайное (14 и 14 соответственно) (табл.1). Причем в первом случае (окрестности пос. Молодежный) число учетных экскурсий превосходило более чем в два раза (утренние и вечерние), чем в окрестностях д. Жердовка.



Рис. 3. Северный сорокопут *Lanius borealis*
Окрестности д. Жердовка 14.11.2021. Фото авторов

Для сравнительного анализа наших встреч северного сорокопута в Иркутском районе со встречами других наблюдателей этого вида в Иркутском районе мы сделали выборки, представленные в таблицах 2 и 3.

Результаты выборки встреч северного сорокопута в Иркутском районе из статьи В.В. Попова [24] представлены в таблице 2.

Таблица 2 - Встречи северного сорокопута *Lanius borealis* в Иркутском районе (выборка из публикации В.В. Попова) [24]

№	Дата	Место встречи	Источник
1	13.09.1973	Дер. Хомутово	Картотека ИГУ
2	26.09.1978	Иркутск	Картотека ИГУ
3	26.09.1964	Река Ушаковка	Картотека ИГУ

4	29.09.1974	Этнограф.музей	Картотека ИГУ
5	30.09.1979	Иркутск	Картотека ИГУ
6	04.10.1964	пос. Б.Голоустная	Картотека ИГУ
7	05.10.1974	Иркутск	Картотека ИГУ
8	10.10.1963	Иркутск	Картотека ИГУ
9	13.10.1975	Иркутск	Картотека ИГУ
10	21.10.1982	Иркутск	Картотека ИГУ
11	23.10.1985	Иркутск	Картотека ИГУ
12	29.10.1973	Иркутск	Картотека ИГУ
13	10.11.1919	Долина р. Ушаковки	Дурнев Ю.А. др., (2010) цит. по В.В. Попову
14	16.11.1980	Иркутск	Картотека ИГУ
15	25.11.1979	Иркутск	Картотека ИГУ
16	27.11.1976	Иркутск	Картотека ИГУ
17	27.11.1971	Иркутск	Картотека ИГУ
18	28.11.1974	Иркутск	Картотека ИГУ
19	05.12.1959	с. Куда	Картотека ИГУ
20	14.12.1972	Иркутск	Картотека ИГУ
21	14.12.1974	Иркутск	Картотека ИГУ
22	01.01.2010	окр Иркутска	Сайт Природа Сибири
23	26.01.2013	окр Иркутска	Сайт Природа Сибири
24	12.02.2001	М.Голоустное	Пыжьянов С.В. и др., (2010) цит. по В.В. Попову
25	04.02.1966	д.Худяково	Картотека ИГУ
26	04.02.1966	Иркутск	Картотека ИГУ
27	08.02.1984	Иркутск	Картотека ИГУ
28	13.02.2016	Иркутск	Сайт Природа Сибири
29	16.02.2014	окр Иркутска	Сайт Природа Сибири
30	23.02.1965	Иркутск	Картотека ИГУ
31	27.02.2015	окр Иркутска	Сайт Природа Сибири
32	02.03.1979	Иркутск	Картотека ИГУ
33	05.03.1984	Иркутск	Картотека ИГУ
34	11.03.1984	Иркутск	Картотека ИГУ
35	19.03.1988	Иркутск	Картотека ИГУ
36	21.03.1984	Иркутск	Картотека ИГУ
37	23.03.1978	Байкальский тракт	Картотека ИГУ
38	23.03.1984	Иркутск	Картотека ИГУ

39	26.03.1966	Мальничная падь	Картотека ИГУ
40	08.04.1989	д. Пивовариха	Картотека ИГУ
41	08.04.2017	Иркутск	Сайт Природа Сибири
42	15.04.1967	Река Ушаковка	Картотека ИГУ
43	16.04.1964	Река Ушаковка	Картотека ИГУ
44	20.04.1983	Падь Крестовая	Картотека ИГУ
45	04.05.1974	Иркутск	Картотека ИГУ

Результаты выборки встреч северного сорокопута *Lanius borealis* в Иркутском районе по данным сайтов «Птицы Сибири» (www.siberia.russia.birding.day) и «Inaturalist.org» (www.inaturalist.org) представлены в таблице 3. Выборка на сайте Inaturalist.org осуществлялась по трем фильтрам: вид Северный сорокопут *Lanius borealis*, местоположение Иркутский район и исследовательский уровень.

Таблица 3 – Встречи серого сорокопута *Lanius borealis* по данным сайтов «Птицы Сибири» и «Inaturalist.org»
(Выборка авторов на 20 января 2025)

№	Дата	Место встречи	
1	26.01.2013	окр. Турская	Птицы Сибири
2	05.10.2014	окр. д. Куда-Талька	Птицы Сибири
3	04.10.2015	окр. д. Куда-Талька	Птицы Сибири
4	21.11.2015	окр. д. Куда-Талька	Птицы Сибири
5	03.03.2017	окр. д. Турская	Птицы Сибири
6	04.03.2017	Иркутск, о-в Конный	Птицы Сибири
7	04.03.2017	окр. д. Турская	Птицы Сибири
8	09.03.2017	окр. д. Турская	Птицы Сибири
9	23.09.2018	Иркутск, о-в Конный	Птицы Сибири
10	08.10.2018	Иркутск, о-в Конный	Птицы Сибири
11	09.12.2018	Иркутск, о-в Конный	Птицы Сибири
12	02.01.2019	д. Усть-Куда	Птицы Сибири
13	04.03.2019	п.Листвянка	Птицы Сибири
14	04.11.2019	д. Куда	Птицы Сибири
15	01.10.2020	Иркутск, Батарейная	Птицы Сибири
16	08.11.2020	Иркутск, о-в Конный	Птицы Сибири
17	02.12.2020	с. Оек	Птицы Сибири
18	17.01.2021	Иркутск, Луговое	Птицы Сибири
19	29.10.2021	Иркутск, Луговое	Птицы Сибири
20	31.10.2021	с. Оек	Птицы Сибири
21	31.10.2021	окр. д. Турская	Inaturalist.org

22	10.11.2021	Иркутск, Луговое	Птицы Сибири
23	25.01.2022	Иркутск, М.Конева	Птицы Сибири
24	03.02.2022	д. Худяково	Птицы Сибири
25	11.04.2022	д. Худяково	Птицы Сибири
26	22.04.2022	окр. д.Еловки	Птицы Сибири
27	23.11.2022	Иркутск, о-в Конный	Птицы Сибири
28	07.02.2023	окр. д. Худяково	Птицы Сибири
29	03.03.2023	пос. Молодежный	Inaturalist.org
30	07.03.2023	пос. Молодежный	Inaturalist.org
31	15.03.2023	между дд. Сайгуты и Баруй	Птицы Сибири
32	19.03.2023	Иркутск, о-в Конный	Птицы Сибири
33	21.03.2023	Иркутск, М.Конева	Птицы Сибири
34	08.01.2024	окр. Хомутово, Качуг. тракт	Птицы Сибири
35	18.10.2024	окр. дд. Куда-Талька	Птицы Сибири
36	07.12.2024	Иркутск, Луговое	Птицы Сибири

3. Выводы.

1. Исходя из нашего опыта наблюдений в Иркутском районе при ежедневном прохождении постоянных (стационарных) учетных маршрутов в окрестностях пос. Молодежный [5] и д. Жердовка [7], где фиксировались встречи всех видов и определялась частота встречаемости, серый сорокопут *Lanius excubitor* или он же северный сорокопут *Lanius borealis sibiricus* действительно редкий вид, появляющийся на зимовке в начале октября и отлетающий из Иркутского района во второй половине апреля.

Если считать участок между пос. Молодежный и лыжной базой ИрГАУ, где проходил наш первый учетный маршрут, селитебной территорией диффузного типа, то наш результат совпадает с выводами Ю.И. Мельникова [18]. Но в окрестностях д. Жердовка 12 встреч из 14 имели место вдали от селитебной территории, по правому берегу реки Куда, что может быть связано с пролетом или кочевками вида вдоль поймы реки Куда (с предпочтением правого, более высокого берега, с наличием достаточно обильного числа присад) (табл.1).

Последние встречи (в первой декаде октября) снова подтверждают нашу гипотезу высказанную ранее в статье [8], что наиболее заметное

перемещение сорокопута в Иркутском районе происходит в первой декаде октября, и, вероятно, во второй декаде октября.

2. За годы наших наблюдений мы только дважды фиксировали поющего сорокопута в марте 2017 года [6]. Летних встреч у нас не было ни разу. Поэтому предполагаем, что гнездование в Иркутском районе маловероятно, но согласны с В.В. Поповым, что наш сорокопут, будет ли он серый *Lanius excubitor* или северный *Lanius borealis sibiricus*, скорее всего, гнездится в северных районах Иркутской области. И по нашему мнению, весьма вероятно, гнездование сорокопута в подгольцовые или гольцах Хамар-Дабана, Восточного Саяна и Байкальского хребта.

3. Также вполне разделяем мнение Ц.З. Доржиева и соавторов и М.В. Сониной о том, что в нашем регионе зимой серый (северный) сорокопут является по преимуществу облигатным орнитофагом, и помимо больших синиц и чечеток, может успешно охотиться на других воробьиных, что не исключает в отдельных случаях и охоты на мышевидных грызунов.

Относительное обилие встреч вида в Иркутске, как отмечают Ю.И. Мельников и В.В. Попов, на наш взгляд, связано не только с высокой концентрацией в данном городе специалистов-орнитологов, но и в первую очередь, с концентрацией зимующих воробьиных.

4. Основной вывод по данным таблиц 1, 2, 3 – северный сорокопут с большой вероятностью не гнездится в Иркутском районе и является редким видом, численность и распространение которого по другим регионам области практически неизвестна.

5. Как отмечает белорусский орнитолог М.Ю. Немчинов, во многих странах мира четко наметилась тенденция сокращения и снижения численности популяций серого сорокопута *Lanius excubitor*, вплоть до полного исчезновения, что связано в основном с причиной уменьшения площадей, пригодных для обитания вида. А также, что вид крайне слабо изучен в Беларуси [21].

Что касается нашего региона, то северный сорокопут *Lanius borealis sibiricus*, гнездящийся в горных условиях, вероятно, менее подвержен сокращению площадей обитания (если не считать лесных пожаров в кедровых стланиках и на верхней границе леса). Но для его популяций, гнездящихся в северных районах, помимо лесных пожаров, площади обитания могут существенно сокращать концентрированные лесные вырубки. Учитывая эти тенденции, а также практически полную неизученность вида в Иркутской области, северный сорокопут должен быть в Красной книге Иркутской области.

ЛИТЕРАТУРА

1. Абрамова И.В. Экология серого сорокопута (*Lanius excubitor* L., Laniidae, Passeriformes) в Юго-Западной Беларуси // И.В. Абрамова, В.Е. Гайдук // Веснік Брэсцкага ўніверсітэта. Серыя 5: Хімія. Біялогія. Навукі аб зямлі. 2011. № 2. С. 28-32.
2. Анисимова В.И. Характеристика весенней миграции некоторых видов птиц на Юго-Восточном побережье Байкала / В.И. Анисимова, Ю.А. Анисимов // Сибирский экологический журнал. 2023. Т. 30. № 3. С. 267-275.
3. Богданов М. Н. Сорокопуты русской фауны и их сородичи [Электронный ресурс] / М. Богданов. - СПб., 1881 (2016). - [6], XII, 220 с. Режим доступа: <https://elibrary.ru/handle/123456789/216435>
4. Богородский Ю.В. Птицы Южного Предбайкалья. - Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та. 1989. 208 с
5. Винобер А.В. Динамика населения птиц за март (2016-2018 гг.) и октябрь (2016-2018 гг.) в окрестностях поселка Молодежный (Иркутский район) / А.В. Винобер, Е.В. Винобер // Биосферное хозяйство: теория и практика. 2018. – 6 (9). С. 36-42
6. Винобер А.В. Осенняя динамика орнитофауны в окрестностях д. Жердовка (2020-2021 гг.) и пос. Молодежный (2016-2019 гг.) Иркутского района (сравнительный анализ) / А.В. Винобер, Е.В. Винобер // Биосферное хозяйство: теория и практика. 2021 № 10 (39). С. 39-47.
7. Винобер А.В. Мартовская динамика орнитофауны в окрестностях пос. Молодежный (2016-2020 гг.) и д. Жердовка (2021-2023 гг.) Иркутского района: подекадный метод сравнения / А.В. Винобер, Е.В. Винобер // Биосферное хозяйство: теория и практика. 2023 № 4 (57). С. 76-90.
8. Винобер А.В. Орнитофауна окрестностей деревни Жердовка Иркутского района / А.В. Винобер, Е.В. Винобер // Биосферное хозяйство: теория и практика. 2023 № 10 (63). С. 101-107.
9. Гагина Т.Н. Птицы Восточной Сибири (список и распространение) // Тр. Баргузинского заповедника 1961. 3. С. 99-123

10. Григорьев Э.В. Встреча выводка серого сорокопута *Lanius excubitor* в Новоржевском районе Псковской области // Русский орнитологический журнал. 2020. Т. 29. № 1944. С. 3034-3037.
11. Доржиев Ц.З., Дурнев Ю.А., Сони́на М.В., Елаев Э.Н. Глава 3. Повидовые очерки птиц // В книге: Птицы Восточного Саяна. - Улан-Удэ, 2019. С. 43-305.
12. Забелин В.И. Пухляк (*Parus montanus*, Aves) в сообществах зимующих птиц горной тайги Тувы // Байкальский зоологический журнал. 2017. № 2 (21). С. 17-19.
13. Ивановский В.В. Серый сорокопут (*Lanius excubitor*) на верховых болотах Северной Беларуси / В.В. Ивановский, В.Я. Кузьменко // Subbuteo. 1998. Т. 1. № 1. С. 21-24.
14. Ковалевский А.В. Распространение видов семейства сорокопутовые Laniidae в Кузнецко-Салаирской горной области / А.В. Ковалевский, Я.А. Редькин, В.Б. Ильяшенко, Н.В. Скалон // Вестник Томского государственного университета. Биология. 2015. № 4 (32). С. 76-90.
15. Красная книга Республики Бурятия (издания 2002 и 2005 года). Серый сорокопут [Электронный ресурс] // ИАС «Природа Бурятии». Режим доступа: https://redbook.burpriroda.ru/2004/animals/birds_detail.php?ID=2531 (дата обращения 5.01.2025)
16. Мельников Ю.И. Зимовки серого *Lanius excubitor* (L. 1758) и клинохвостого *Lanius sphenocercus* (Cabanis, 1873) сорокопутов в истоке р. Ангары (Южное Предбайкалье) // Байкальский зоологический журнал. 2010. № 1 (4). С. 37-40.
17. Мельников Ю.И. Очерк зимнего населения птиц правобережья истока р. Ангара (Южный Байкал) // Байкальский зоологический журнал. 2012. № 2 (10). С. 43-65.
18. Мельников Ю.И. Разнообразие птиц наземных экосистем Южного Байкала в экстремальных условиях зимнего периода // Известия Иркутского государственного университета. Серия: Биология. Экология. 2015. Т. 11. С. 43-57.
19. Мельников Ю.И. Птицы Дендрологического парка Байкальского музея Иркутского научного центра // Байкальский зоологический журнал. 2016. 2. С. 72-80
20. Немчинов М.Ю. Репродуктивная биология популяций серого сорокопута (*Lanius excubitor*) в Беларуси / М.Ю. Немчинов, В.В. Гричик // Вестник БГУ. Серия 2: Химия. Биология. География. 2008. № 1. С. 38-42.
21. Немчинов М.Ю. Экологические особенности серого сорокопута (*Lanius excubitor* L., 1758) в Беларуси / М.Ю. Немчинов // 61-й научная конференция студентов и аспирантов Белгоуниверситета (Минск, 14-16 мая 2004): Сборник работ. В трех частях. Ч. 2. – Минск: Белорусский государственный университет. 2004. С. 34-37.
22. Обыкновенный серый сорокопут – *Lanius excubitor excubitor* (Linnaeus, 1758) [Электронный ресурс] // Красная Книга Томской области ОГБУ «Облкомприрода». Режим доступа: <https://green.tsu.ru/redbook/?p=426>

23. Панов Е. Н. Сорокопуть (семейство Laniidae) мировой фауны. Экология, поведение, эволюция. — М.: Товарищество научных изданий КМК, 2008. 714 с.
24. Попов В.В. Северный сорокопуть *Lanius borealis* в Иркутской области / В.В. Попов // Русский орнитологический журнал. 2018. Т. 27. № 1622. С. 2727-2732.
25. Сони́на М.В. Зимующие птицы города Иркутска: эколого-фаунистический обзор // Байкальский зоологический журнал. 2009. 2. С. 80-84.
26. Сони́на М.В. Птицы диффузного города в условиях Байкальского побережья / М.В. Сони́на, Н.В. Морошенко // Байкальский зоологический журнал. 2010. № 1 (4). С. 71-77.
27. Степанян Л.С. Конспект орнитологической фауны СССР. М.: Наука, 1990. 726 с.
28. E. Vytautas, J. Vesta. The first record of the Siberian northern shrike (*Lanius borealis sibiricus*) in Lithuania with molecular confirmation // Biologija. 2020. Vol. 66. No. 1. PP. 21–26. DOI: 10.6001/biologija.v66i1.4187
-

A. V. Vinober, E. V. Vinober

«Siberia Land Congress» Biosphere and Agriculture Economies Support and Development Fund, Irkutsk, Russia

NORTHERN SHRIKE *Lanius borealis* IN IRKUTSK REGION

The ecology and geography of the northern shrike are considered in general terms according to literary sources. Our own results are mainly of a phenological nature. A list of northern shrike sightings in the Irkutsk region is presented according to the authors' observations for 2014-2024 (28 sightings). The authors also made a selection of meetings in the Irkutsk region from V.V. Popov's article "The Northern shrike Lanius borealis in the Irkutsk region" (45 meetings). As well as a selection of meetings in the Irkutsk region according to the websites "Birds of Siberia" and "INaturalist.org" (36 meetings). According to the authors, the northern shrike is a rare species that appears on wintering grounds in early October and departs from the Irkutsk region in the second half of April. Given the trends of decreasing and declining populations of the gray shrike worldwide, as well as the almost complete lack of study of the species in the Irkutsk region, the northern shrike should be in the Red Book of the Irkutsk region.

Keywords: northern shrike, Lanius borealis, wintering, phenology, Irkutsk region

Поступила в редакцию 28 января 2025